

[ACCUEIL](#) > [DEPHY](#) > [CONCEVOIR SON SYSTÈME](#) > [SYSTÈME AGROSEM - CONDOM](#)

Système Agrosem - Condom

- Désherbage mécanique/thermique
- Diversification et allongement de la rotation
- MAE et lutte biologique par conservation
- Lutte biologique par introduction
- Mesures prophylactiques
- Régulation biologique

[PARTAGER](#)

Année de publication 2019 (mis à jour le 13 Mar 2024)

Carte d'identité du groupe



Structure de l'ingénieur réseau

Conventionnel

Nom de l'ingénieur réseau

AGROSEM

Date d'entrée dans le réseau

Condom

Zéro Phyto de Synthèse

Objectif de réduction visé

Présentation du système

Conception du système

Le système testé a été élaboré en 2018 au cours de 3 ateliers de co-conception, comme les systèmes mis en place sur les 2 autres sites de Castelnaudary et Brain-sur-l'Authion. Ces ateliers enc culturels sur 8 à 10 ans avec au moins une espèce de chaque groupe travaillé par la FNAMS : céréales à paille, protéagineux, fourragères, potagères et betteraves sucrières. Les rotations fétuque élevée, de la luzerne, de l'orge de printemps qui sert de couvert à l'implantation de la luzerne, un pois protéagineux d'hiver en mélange avec de l'orge d'hiver, de la carotte, de l'printemps. Ce système mis en place pourra être adapté en fonction du contexte local et des premiers résultats obtenus.

Mots clés :

Porte-graine - Cultures sous couvert - Désherbage mécanique - Biocontrôle - OAD

Caractéristiques du système

Schéma de la succession culturale à venir

Espèces : blé tendre, fétuque élevée fourragère, orge de printemps, luzerne, carotte, oignon, pois protéagineux (associé à de l'orge d'hiver), betterave sucrière.

Interculture : couverts semés sur interculture longue : sorgho, féverole

Fertilisation : bilan azoté moins 15 %.

Gestion de l'irrigation : à partir de sondes tensiométriques et d'un bilan hydrique.

Photo à venir

Travail du sol/gestion des adventices : labour fréquent, faux-semis si possible, herse étrille, bineuse.

Circuit commercial : les cultures ne sont pas commercialisables (pas de contrat de production de semences).

Infrastructures agro-écologiques : bandes fleuries et bandes enherbées.

Objectifs ▲

Agronomiques	<ul style="list-style-type: none"> Rendement : compatible avec une rémunération suffisante pour l'agriculteur Qualité : faculté germinative, pureté spécifique et taux de matières inertes conformes aux exigences des règlements techniques de production et conventions types
Environnementaux	<ul style="list-style-type: none"> IFT : objectif 'Zéro Phyto de Synthèse'
Maîtrise des bioagresseurs	<ul style="list-style-type: none"> Maîtrise des adventices : absence de graines non triées dans les lots et graines interdites dans les règlements techniques Maîtrise des maladies : absence de maladies transmissibles par les semences Maîtrise des ravageurs : limiter les dégâts de ravageurs pour obtenir un rendement correct et des semences de qualité
Socio-économiques	<ul style="list-style-type: none"> Marge brute : rémunération attractive pour l'agriculteur multiplicateur de semences. Temps de travail : tâches équilibrées sur l'année



Le mot de l'expérimentateur

Texte à compléter

Stratégies mises en œuvre :

Gestion des adventices ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma de gestion des adventices.

Schéma décisionnel pour la gestion des adventices Agrosem Condom



Leviers	Principes d'action	Enseignements
Semis sous couvert	Le couvert de la fourragère porte-graine permet d'occuper le sol et de limiter l'espace pour les adventices .	Attention à la concurrence entre culture et fourragère porte-graine pour l'eau en année sèche. Dans le Sud-Ouest, le tournesol est un bon couvert pour la luzerne.
Plantation au printemps	Les carottes porte-graine sont habituellement semées entre août et septembre. La conception de plants (arrachis) en pépinière, puis la plantation en mars limite la période où les carottes ne couvrent pas le sol.	Pour réussir la plantation, planter le collet à 1-2 cm en dessous du collet. Cependant la plantation demande de la main d'œuvre, du matériel.
Ajout d'orge	Dans le pois, l'orge est là pour couvrir le sol, puis pour servir de tuteur au pois.	Obtenir une maturité du grain simultanée entre l'orge et le pois. Le pois trop sec (problème de germination par la suite). Cep sur la parcelle.
Ci (culture intermédiaire)	Culture intermédiaire bien développée pour éviter que des adventices ne poussent et grainent entre deux cultures.	Seul un couvert bien développé assure un effet contre les adventices.
Labour	Labour pour détruire les cultures pérennes (fourragères) et ameublir le sol pour les futures plantations. Dans un sol avec une structure fragmentaire, les racines de carotte et betterave reprennent mieux et concurrencent plus les adventices.	4 labours sur une rotation de 8 ans pour diminuer le stock de semences.
Herse étrille, binage, buttage	Désherbage mécanique.	À réaliser quand la culture le supporte, au stade jeune de la culture.
Ecimage	Coupe du haut des plantes.	Le fol avoine peuvent souvent être écimés dans les céréales.
Vibros croisés	Après la précoupe habituelle sur luzerne porte-graine, le vibroculteur est passé en deux passages croisés pour éliminer un maximum d'adventices. La luzerne bien implantée repousse par la suite.	Les deux passages de vibroculteur peuvent endommager la luzerne. Le vibroculteur peut également être utilisé l'hiver pendant la culture de la luzerne.

Gestion des ravageurs ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma de gestion des ravageurs.

Schéma décisionnel pour la gestion des ravageurs Agrosem Condom

Leviers	Principes d'action	Enseignements
Bilan N-15%	Ne pas attirer les pucerons avec des plantes trop poussantes.	Pas de puceron observé sur orge de printemps.
Implantation au printemps	Eviter la période automnale favorable à l'installation des pucerons.	Pas de puceron observé sur orge de printemps.
Précoupe tardive	Fait repousser la luzerne à une période où les ravageurs du feuillage ne sont plus présents, rompt le cycle des ravageurs	Possible sur le site car sol très argileux à bonne réserve en e
Binage contre les campagnols	Perturbation du sol qui détruit les galeries de campagnols et les incitent à aller ailleurs.	Campagnols présents dans les bandes fleuries à proximité. r
Écimage	Lors de l'écimage habituel des betteraves si des pucerons sont présents sur les hauts des hampes florales des betteraves, ils tombent au sol et ne remontent pas sur les hampes.	Cette opération systématique aide à gérer les populations de
Bandes fleuries et bandes enherbées	Mise en place depuis le printemps 2019 de bandes fleuries pour attirer des auxiliaires généralistes toutes les 2 parcelles de production. Bandes enherbées entre 2 parcelles de production en alternance avec les bandes fleuries pour un continuum de végétation entre parcelles et pour circuler.	Il semble que les populations de pucerons se développent coccinelles arrivent dans un second temps et sont préser cultures. Les populations de pucerons ont toujours été tolér
Biocontrôle	Des produits de biocontrôle ou UAB peuvent être appliqués : phosphate ferrique contre les limaces, spinosad contre les lixus..	Seul le spinosad contre les lixus de la betterave est i accouplements.

Gestion des maladies ▲

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation et permettant une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce sch gestion des maladies.

Schéma décisionnel pour la gestion des maladies Agrosem Condom



Leviers	Principes d'action	Enseignements
Variété rustique	Variété présentant peu d'écart de rendement entre modalités traitées et non traitées.	Maladies assez peu présentes en général.
Variété peu sensible	Variété peu sensible à une maladie en particulier (rouille sur luzerne, rouilles sur fétuque élevée, mildiou sur oignon).	Maladies assez peu présentes en général.
Bilan N -15%	Calcul de la dose d'engrais azoté par la méthode du bilan, diminué de 15%. Plantes moins sensibles aux maladies.	Maladies assez peu présentes en général.
Plantation de printemps	Choix d'un type variétal à implanter au printemps pour éviter les conditions hivernales, favorables au mildiou de l'oignon.	Choix efficace : généralement peu de mildiou est observé sur les j
Dilution des pois dans l'orge	Plus faible probabilité que les spores passent d'un pied de pois à l'autre.	Concurrence de l'orge pour la lumière et l'eau. Attention, l'ombr d'entrée pour la bactériose.
Végétation aérée Irrigation le matin	Limiter le microclimat humide favorable aux maladies.	Peu d'humidité stagnante.
Pieds bourrus	Arrachage manuel et destruction des pieds « bourrus », porteurs d'inoculum de mildiou.	Peu de plants « bourrus » sont présents dans les plantations de pi
Biocontrôle	Applications de cuivre et/ou de soufre.	Alterner cuivre et soufre.

Maîtrise des bioagresseurs

	Dicotylédones adventices	Graminées adventices	Adventices vivaces	Bruche du pois	Lixus de la betterave	Pucerons sur céréales, pois, betterave, carotte	Tychius et punaises sur luzerne
2018-2019	Yellow	Yellow	Green	Red	Red	Green	
2019-2020	Yellow	Yellow	Green	Red	Green	Green	Yellow
2020-2021	Red	Yellow	Yellow	White	Green	Yellow	Green
2021-2022	Green	Green	Yellow	Red	Yellow	Green	Green
2022-2023	Green	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow	?

* Texte à compléter

Adventices

Ravageurs


Maladies

Performances du système

Performance agronomique

Les performances agronomiques des productions de semences produites dans AgroSem sont évaluées au travers des rendements grainiers, de la faculté germinative et de la pureté spécifique.


- Rendements grainiers obtenus dans le système AgroSem de Condom



*A compléter (texte)


- Qualités obtenues dans le système AgroSem de Condom

Nombre de lots produits répondant aux normes de faculté germinative



A compléter (texte)

Nombre de lots produits répondant aux normes de spécifique




A compléter (texte)

Performance environnementale

- Indicateur de Fréquence de Traitement

Indicateur de Fréquence de Traitement en % des IFT de référence




Le principe de l'expérimentation est de ne pas synthétiser. Les IFT sont donc très fortement réduits. Les biocontrôles ont été utilisés.


Les données présentées sont issues des moyennes de références choisies sont des itinéraires techniques pour la betterave, la carotte, la féruque, le haricot et les enquêtes économiques de la FNAMS.

- Consommation de carburant et d'eau d'irrigation

Consommation de carburant en % de la référence



Quantité d'eau d'irrigation




L'utilisation du désherbage mécanique, de l'implantation de couverts d'inter-culture et le choix de la plantation des carottes entraînent souvent une surconsommation de carburant par rapport aux références (itinéraires à dire d'expert ou issus des enquêtes économiques FNAMS). *A compléter (texte)*


Performance économique

- Temps de travail et charges directes

Temps de travail pour la campagne 2021-2022



Charges directes de la campagne




A compléter (texte)

Les charges directes des cultures comprennent les intrants (semen intrants), les charges de mécanisation et les charges salariales. Les calc charges les plus importantes dans cette expérimentation se trouvent er pour l'instant important, mais il pourrait diminuer si les pépinières étaien

Evaluation multicritère

Evaluation multicritères des cultures du système d'Agrosem Condom en % de la référence (moyenne 2019-2022)



A compléter (texte)

Zoom sur... (titre à compléter) ▲

* A compléter

Transfert en exploitations agricoles ▲

* A compléter

Pistes d'amélioration, enseignements et perspectives

Texte à compléter

Contact



Fernand ROQUES

Pilote d'expérimentation - FNAMS

✉ fernand.roques@fnams.fr

📞 0630725127