

plus élevée qui améliore l'efficacité d'herbicides comme le flufenacet. Tout cela converge vers une lutte plus performante contre les adventices avec le challenge de ne faire qu'un seul passage herbicide au lieu de deux ou trois. »

Vincent Leroux est surtout ennuyé par les ray-grass. « Je retrouve cette adventice dans les céréales d'hiver et de plus en plus dans les cultures de printemps. J'ai choisi de labourer davantage. Près de 80 % des céréales ont été semées après labour la campagne passée. Cela fait partie des armes efficaces contre les adventices. »

L'agriculteur table également sur la rotation diversifiée de ses cultures pour mieux contrôler les mauvaises herbes. « J'alterne cultures d'hiver et cultures de printemps. Je ne fais jamais de blé sur blé. Cette rotation diversifiée m'offre une variété de matières actives et de produits pour lutter contre les graminées, par exemple, Kerb Flo (propyzamide) sur colza et luzerne, Mercantor Gold (s-métolachlore) sur betterave, Select (cléthodime) sur lin, pois et betterave... Sur des cultures comme la betterave et le maïs, j'ai recours en outre au binage contre les adventices. »

Casser la rotation en cas d'infestation de graminées

Bertrand Omon met en avant l'efficacité de la rupture rotationnelle. « Quand on est confronté à une forte pression de graminées dans une céréale, il n'y a pas d'autre choix que de casser la rotation. Cela permet d'introduire des cultures offrant moins de potentiel de levée de ces adventices et d'utiliser des herbicides bien différents de ceux appliqués sur céréales. Mais attention : il y a des rotations qui sont des faux amis. Le colza ne convient pas s'il est encadré par deux céréales, ni un blé qui revient tous les deux ans. Dans ces cas, la coupure rotationnelle n'est pas suffisamment longue. »

Vincent Leroux voit des limites à ne recourir qu'à la post-levée précoce en désherbage du blé. « Cela impose d'intervenir au bon stade, à 1-2 feuilles du ray-grass et 2 feuilles du blé. On n'a alors qu'une cartouche pour réussir son désherbage. Or, des pluies ou des

AVIS D'EXPERT

LUDOVIC BONIN, responsable du pôle Flores adventices à Arvalis

“ Faire face à un risque d'échec d'un désherbage prélevé »

« En année sèche, il arrive qu'un traitement de prélevée ne fonctionne pas. Si les conditions ne sont pas réunies pour assurer l'efficacité de ce traitement, on peut limiter son désherbage à des interventions de post-levée précoce. Le mélange de produits comme Mercure-Défi, Fosburi-chlortoluron, Mateno-Prowl, Fosburi-Défi ou Daiko fonctionne très bien à condition de l'utiliser au stade 1 feuille du blé.

Au stade 3 feuilles, les mêmes produits sont possibles mais moins efficaces sur les adventices. Sur ces plantes au stade 2 feuilles, des molécules tel que le flufenacet perdent beaucoup en efficacité. Des programmes sont possibles en post-levée avec, par exemple, un

traitement à base de Fosburi en post-levée précoce suivi d'un mélange Défi-Beflex à 3 feuilles du blé. Mais attention à la faisabilité : plus les traitements sont tardifs, plus il y a des risques de pluie et de mauvaise portance des sols pour assurer un passage. Malgré tout, même quand les conditions de traitement ne sont pas idéales, il ne faut pas se couper de la prélevée, dans les situations avec une grande quantité de ray-grass ou de vulpin. À l'automne 2020, nous avons connu ces conditions avec l'impression de sol sec. Pourtant, dans nos essais, les programmes de prélevée + post-levée apportaient une meilleure efficacité

que ceux de post-levée seule. L'utilisation d'une herse étrille ou d'une houe rotative est possible en conditions sèches, jusqu'à 2-3 feuilles du blé. Si la sécheresse est forte, l'efficacité contre les adventices ne sera pas au rendez-vous car celles-ci ne germeront pas. Enfin, la stratégie d'un retard de semis de deux à trois semaines fonctionne bien lors d'automne secs, mais avec une efficacité moindre : on obtient une baisse de 40 à 50 % des populations de graminées contre jusqu'à 80 % en conditions normales. »



LA RÉSISTANCE DU RAY-GRASS À DE NOMBREUX HERBICIDES peut imposer d'avoir recours à la diversification de cultures dans la rotation pour multiplier les moyens de lutte possible.

premières gelées peuvent empêcher de traiter au bon stade. Pour cette raison, j'ai dû attendre un 28 janvier la campagne passée pour désherber l'une de mes parcelles. » Pour l'automne 2022, l'agriculteur songe à utiliser un nouveau produit en prélevée efficace sur ray-grass, Mateno, avec la possibilité d'un rattrapage en post-levée dans les parcelles sales avec Fosburi + Daiko. La priorité reste de ne pas se laisser déborder par la graminée adventice. Christian Gloria

HERBICIDES SUR PARCELLES DE BLÉ TENDRE EN 2021-2022 CHEZ VINCENT LEROUX

Précédent	Date semis	Date traitement	Produits et doses l/ha
✓ Betterave	17 octobre	12 novembre	Minarix 2,2 + Fosburi 0,5
		9 décembre (1 parcelle)	chlortoluron 2,2 l + Compil 0,15
✓ Maïs	9 novembre	16 décembre	Aranda 2
✓ Betterave	23 novembre	28 janvier	Défi 2,5 + Compil 0,2